定時薬：	頓服薬：

※定時薬や頓服薬の種類や量が変わった時は、新しいページを使用してください

月日	最も弱い痛み：〇、平均の痛み：△,最も強い痛み：×	眠気	吐気	定時薬使用時刻	頓服薬使用時刻	頓服薬の回数	使用した下剤	便通	メモ
例	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	7	5	7時、19時 10時	4時、13時、22時	3回	プルセニド4錠	有・無	
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10							有・無	
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10							有・無	
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10							有・無	
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10							有・無	
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10							有・無	
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10							有・無	
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10							有・無	
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10							有・無	
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10							有・無	
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10							有・無	
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10							有・無	
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10							有・無	
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10							有・無	