

「ダットスキャン」(レビー小体型認知症/パーキンソン病 診断用脳 SPECT) に関する併用薬の情報提供依頼について (放射線科より医療機関の方へ)

標記の検査をお申込みいただく際、当該患者さんに投与されている薬剤の中に、検査所見に影響を与える可能性があるものが含まれているかどうかをご確認いただき、該当するものがある場合は「その他の特記事項」欄にご記載くださいますようお願い申し上げます。

【添付文書上の併用注意薬剤】

- | | |
|-------------|--|
| (1) 中枢神経刺激剤 | メチルフェニデート「リタリン」(2日) |
| (2) 抗うつ薬 | アモキサピン「アモキサン」(記載なし)
フルボキサミン「ルボックス」(5日)
パロキセチン「パキシル」(5日)
セルトラリン「ジェイゾロフト」(6日) |
| (3) 食欲抑制剤 | マジンドール「サノレックス」(3日) |
| (4) コカイン系製剤 | (記載なし) |
| (5) 中枢興奮剤 | メタンフェタミン「ヒロポン」(3日) |

上記の薬剤が投与されている状態の患者さんは、これらが検査所見に影響を与え正しい診断ができなくなる可能性があります、上記カッコ内は、この影響を軽減するために国内ガイドラインで推奨されている休薬期間で、可能であれば検査前にこの程度の日数の休薬を患者に指示していただくと検査の妥当性が向上すると考えられますが、患者さんの病状によっては休薬が望ましくない場合もあると思われまますので、個々の症例によって適宜ご判断いただければ幸甚です。

以上、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

令和8年2月

岩手県立中部病院 放射線科