

レジメン名	一般名	投与量	投与方法	投与時間	投与日	1コース
mFOLFOX6+Cmab(初回用)	セツキシマブ	400mg/㎡	点滴	2時間	d1	14日
	オキサリプラチン	85mg/㎡	点滴	2時間	d1	
	レボホリナート	200mg/㎡	点滴	2時間	d1	
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴	全開で	d1	
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	持続	46時間	d1	
	セツキシマブ	250mg/㎡	点滴	1時間	d8	
mFOLFOX6+Cmab(2回目以降)	セツキシマブ	250mg/㎡	点滴	1時間	d1	14日
	オキサリプラチン	85mg/㎡	点滴	2時間	d1	
	レボホリナート	200mg/㎡	点滴	2時間	d1	
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴	全開で	d1	
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	持続	46時間	d1	
	セツキシマブ	250mg/㎡	点滴	1時間	d8	
FOLFIRI+Cmab(初回用)	セツキシマブ	400mg/㎡	点滴	2時間	d1	14日
	イリノテカン	150mg/㎡	点滴	90分	d1	
	レボホリナート	200mg/㎡	点滴	2時間	d1	
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴	全開で	d1	
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	持続	46時間	d1	
	セツキシマブ	250mg/㎡	点滴	1時間	d8	
FOLFIRI+Cmab(2回目以降)	セツキシマブ	250mg/㎡	点滴	1時間	d1	14日
	イリノテカン	150mg/㎡	点滴	90分	d1	
	レボホリナート	200mg/㎡	点滴	2時間	d1	
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴	全開で	d1	
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	持続	46時間	d1	
	セツキシマブ	250mg/㎡	点滴	1時間	d8	
mFOLFOX6+Bv	ペバシズマブ	5mg/kg	点滴	90分→60分→30分	d1	14日
	オキサリプラチン	85mg/㎡	点滴	2時間	d1	
	レボホリナート	200mg/㎡	点滴	2時間	d1	
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴	全開で	d1	
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	持続	46時間	d1	
FOLFIRI+Bv	ペバシズマブ	5mg/kg	点滴	90分→60分→30分	d1	14日
	イリノテカン	150mg/㎡	点滴	2時間	d1	
	レボホリナート	200mg/㎡	点滴	2時間	d1	
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴	全開で	d1	
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	持続	46時間	d1	
mFOLFOXIRI+Bv	ペバシズマブ	5mg/kg	点滴	90分→60分→30分	d1	14日
	イリノテカン	150mg/㎡	点滴	1時間	d1	
	オキサリプラチン	85mg/㎡	点滴	2時間	d1	
	レボホリナート	200mg/㎡	点滴	2時間	d1	
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	持続	46時間	d1	
SOX+Bv	ペバシズマブ	7.5mg/kg	点滴	90分→60分→30分	d1	21日
	オキサリプラチン	130mg/㎡	点滴	2時間	d1	
	テガフル・ゲマラシル・オテラシル	80mg/㎡	内服	-	d1タ～d15朝	
XELOX+Bv	ペバシズマブ	7.5mg/kg	点滴	90分→60分→30分	d1	21日
	オキサリプラチン	130mg/㎡	点滴	2時間	d1	
	カベシタピン	2000mg/㎡	内服	-	d1タ～d15朝	
XELIRI+Bv	ペバシズマブ	7.5mg/kg	点滴	90分→60分→30分	d1	21日
	イリノテカン	200mg/㎡	点滴	2時間	d1	
	カベシタピン	1600mg/㎡	内服	-	d1タ～d15朝	
TAS-102(タサ-7)+Bv	ペバシズマブ	5mg/kg	点滴	90分→60分→30分	d1	28日
	トリフルリジン・チピラシル	70mg/㎡	内服	-	d1タ-6朝 d8タ-d13朝	
5-FU/I-LV+Bv(5-FU:2400mg/㎡)	ペバシズマブ	5mg/kg	点滴	90分→60分→30分	d1	14日
	レボホリナート	200mg/㎡	点滴	2時間	d1	
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	持続	46時間	d1	
MSI-High ペムブロリズマブ療法(3週間)	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴	30分	d1	21日
MSI-High ペムブロリズマブ療法(6週間)	ペムブロリズマブ	400mg/body	点滴	30分	d1	42日
(1次治療)MSI-High NIVO+IPI療法	ニボルマブ	240mg/body	点滴	30分	d1	21日
	イピリムマブ	1mg/kg	点滴	30分	d1	
MSI-High NIVO療法(2週間毎)	ニボルマブ	240mg/body	点滴	30分	d1	14日
MSI-High NIVO療法(4週間毎)	ニボルマブ	480mg/body	点滴	30分	d1	28日

セツキシマブ+ビラフトビ+メクトビ療法(初回)	セツキシマブ	400mg/㎡	点滴	2時間	d1	7日
	エンコラフェニブ	添付文書参照	内服	-	連日	
	ビメチニブ	添付文書参照	内服	-	連日	
セツキシマブ+ビラフトビ+メクトビ療法(2回目以降)	セツキシマブ	250mg/㎡	点滴	1時間	d1	7日
	エンコラフェニブ	添付文書参照	内服	-	連日	
	ビメチニブ	添付文書参照	内服	-	連日	
biweekly mFOLFOX6+Cmab+エンコラフェニブ療法	セツキシマブ	500mg/㎡	点滴	2時間	d1	14日
	オキサリプラチン	85mg/㎡	点滴	2時間	d1	
	レボホリナート	200mg/㎡	点滴	2時間	d1	
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴	全開で	d1	
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	持続	46時間	d1	
	エンコラフェニブ	添付文書参照	内服	-	連日	
FOLFIRI療法	イリノテカン	150mg/㎡	点滴	2時間	d1	14日
	レボホリナート	200mg/㎡	点滴	2時間	d1	
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴	全開で	d1	
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	持続	46時間	d1	
mFOLFOX6療法	オキサリプラチン	85mg/㎡	点滴	2時間	d1	14日
	レボホリナート	200mg/㎡	点滴	2時間	d1	
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴	全開で	d1	
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	持続	46時間	d1	
biweekly mFOLFOX6+Cmab	セツキシマブ	500mg/㎡	点滴	2時間	d1	14日
	オキサリプラチン	85mg/㎡	点滴	2時間	d1	
	レボホリナート	200mg/㎡	点滴	2時間	d1	
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴	全開で	d1	
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	持続	46時間	d1	
biweekly FOLFIRI+Cmab	セツキシマブ	500mg/㎡	点滴	2時間	d1	14日
	イリノテカン	150mg/㎡	点滴	90分	d1	
	レボホリナート	200mg/㎡	点滴	2時間	d1	
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴	全開で	d1	
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	持続	46時間	d1	
XELOX療法	オキサリプラチン	130mg/㎡	点滴	2時間	d1	21日
	カペシタビン	2000mg/㎡	内服	-	d1夕~d15朝	
Panitumumab単独療法	パニツムマブ	6mg/kg	点滴	1時間	d1	14日
mFOLFOX6+Panitumumab療法	パニツムマブ	6mg/kg	点滴	1時間	d1	14日
	オキサリプラチン	85mg/㎡	点滴	2時間	d1	
	レボホリナート	200mg/㎡	点滴	2時間	d1	
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴	全開で	d1	
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	持続	46時間	d1	
FOLFIRI+Panitumumab療法	パニツムマブ	6mg/kg	点滴	1時間	d1	14日
	イリノテカン	150mg/㎡	点滴	2時間	d1	
	レボホリナート	200mg/㎡	点滴	2時間	d1	
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴	全開で	d1	
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	持続	46時間	d1	
CPT-11+TS-1(IRIS)(大腸癌)	イリノテカン	125mg/㎡	点滴	90分	d1、d15	28日
	チガフル・ギメラシル・オチラシル	80mg/㎡	内服	-	d1夕~d15朝	
CPT-11+Panitumumab療法	パニツムマブ	6mg/kg	点滴	1時間	d1	14日
	イリノテカン	150mg/㎡	点滴	90分	d1	
FOLFIRI+サイラムザ療法	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴	60分→30分	d1	14日
	イリノテカン	150mg/㎡	点滴	2時間	d1	
	レボホリナート	200mg/㎡	点滴	2時間	d1	
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴	全開で	d1	
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	持続	46時間	d1	
XELIRI療法	イリノテカン	200mg/㎡	点滴	2時間	d1	21日
	カペシタビン	1600mg/㎡	内服	-	d1夕~d15朝	
FOLFIRI+Aflibercept Beta療法	アフリベルセプト ベータ	4mg/kg	点滴	1時間	d1	14日
	イリノテカン	180mg/㎡	点滴	90分	d1	
	レボホリナート	200mg/㎡	点滴	2時間	d1	
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴	全開で	d1	
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	持続	46時間	d1	

Pertuzumab+HER(初回用) (RAS野生型切除不能・進行再発)	ベルツズマブ	840mg/body	点滴	1時間	d1	21日
	トラスツズマブ	8mg/kg	点滴	90分	d1	
Pertuzumab+HER(2回目以降) (RAS野生型切除不能・進行再発)	ベルツズマブ	420mg/body	点滴	30分	d1	21日
	トラスツズマブ	6mg/kg	点滴	30分	d1	

2026年5月改訂